



XyliMelts®

szájszárazság esetén C €

**500mg xylitol és szájnedvesítő
hatóanyag / humectant lassú
kioldódású adhezív tablettában**

***megelőzi a száj kiszáradását éjjel
& nappal kellemes ízű***

- alvás ideje alatt ajánlott használata
– 3-8 órán keresztül fejti ki a hatását
- enyhíti a szájszárazság okozta kellemetlen érzést - napközben akár 4 órán keresztül hat
- A Xylitol (500 mg) csökkenti a lepedék és fogszuvasodás képződését
- Növeli a nyáltermelést
- Hidratál és nyugtató sikosító bevonatot képez a szájban
- Frissíti a lehelletet

• **Adhezív tablettá (nem steril):**

Diszkréten hozzátapad az ínyhez vagy foghoz. A beszédet illetve a megjelenést nem befolyásolja.

Légzéssegítő készülékkel egyidejűleg is alkalmazható.

Fogszabályzó viselése és fogpótlás esetén is használható.

• **Xylitol jótékony hatásai**

1. Csökkenti a lepedéket és a fogszuvasodás képződését: Megfelelő mennyiségű és ideig szájban lévő Xylitol csökkenti a lepedék és fogszuvasodás kialakulását. A XyliMelts-ben található xylitol az alvás ideje alatt fejti ki leghatékonyabban hatását, mikor a nyál mennyisége kevesebb.

2. Az édes íz növeli a nyáltermelést

3. Bevonatot képez a szájban és hidratál (humectant)

Gyakran ismételt kérdések:

XyliMelts okozhat-e székrekedést vagy hasmenést?

Kellemetlen érzés tapasztalható ha rövid idő alatt 5000mg mennyiséget meghaladó xylitol kerül bevitelre. A XyliMelts lassú oldódása épp ezt a diszkomfort érzést hivatott megelőzni.

Terhesség és szoptatás esetén használható-e? Igen

Mi történik ha félrelenyel egy tablettát?


Mivel amint a tablettá szájba, esetleg tüdőbe kerül, egy kis idő elteltével teljesen feloldódik, semmi különleges teendő nincs. Köhögés se gíthet.

Szénhidrát-anyagcsere, cukorbetegség esetén:

1 tablettá 0,25 gramm komplex szénhidrát bevitel mennyiségének megfelelő mértékben növeli a vércukorszintet.

OraCoat XyliMelts®

Használati utasítás:



1. Helyezze a tablettát kívánt magasságban az ínye vagy zápfoga külső részére. A sötétebb fele tapad, míg a fehér oldala érintkezik a szájüregével.
2. Használja nyelvét, hogy minél kényelmesebb helyre tapassza a tablettát.
3. Amennyiben már ott van, hagyja 10 másodpercig érintetlenül. Ne nyomja az ujjával vagy nyelvével, mert befolyásolja a tapadási folyamatot. 5 perc elteltével tapad meg a tablettát teljesen.
4. Amennyiben mégsem megfelelő helyre került a tablettát, 1 percen belül vegye le és nyelvével nyomja a megfelelő helyre.

Alvás ideje alatt: 2 db tablettát használjon, a száj mindkét oldalán egyet-egyet, ugyanis 1 tablettát használata nem elegendő.

Napközben: igény szerinti mennyiségben.
Száraz helyen tartandó.

Figyelem:

- 5 év alatti gyermekek részére nem ajánlott, a lenyelés okozta veszély miatt.
- különösen figyeljen oda, hogy az alvás ideje alatt a fogak vagy az íny külső felszínén helyezze el a tablettát. Amennyiben a szájpadláson helyezné el, fennáll a veszélye, hogy lenyeli vagy a tüdőbe kerül.

Összetevők: xylitol, akáciafa gumi, cellulóz gumi, természetes mentol aroma, kalcium-karbonát, magnézium-sztearát.

Kalcium: kevesebb mint 4 mg (kalcium-karbonát)

Magnézium: kevesebb, mint 0,4 mg.

NEM TARTALMAZ: állati eredetű összetevőket, színezéket, mesterséges aromát vagy tartósítóanyagot illetve kukoricafehérjét, mogyorót, csonthéjas gyümölcsöt, búzát, rizst, glutént, szóját, tojást, halat, kagylót, tejet és élesztőt.

OraCoat termékek gyártója OraHealth,
USA 13440 SE 27th Pl, Bellevue WA

Európai forgalmazó: OraHealth Europa, Ltd.
www.oracoat.eu

Magyarországi forgalmazó:
Interalfa-Complex Kft., 1101 Budapest,
Kőbányai út 30.
office@interalfa.hu

Patent EP 2012768, others pending
Rev 412