

Cotosol® F

Gebruachsinformation	DE
Definition Cotosol® F ist ein feuchtehärtendes, röntgenopakes, weisses Füllungsmaterial zur provisorischen Füllung von Zahnkavitäten. Cotosol® F basiert auf Zinkoxid- / Zinksulfaatfärbung und ist für Kurzzeitprovisionen (Einsatz von max. 1-2 Wochen) konzipiert. Zusammensetzung Zinkoxid Zinkoxid-1-hydrat Calciumsulfaat-hemihydrat Diatomeerde EVA Harz Natriumfluorid Pfefferminzaroma Ausführung Oberflächliche Härtung innerhalb von: 20 - 30 min Durch Kaudruck belastbar nach: 2 - 3 h Anwendungsbgebiete - Provisorische Füllungen von Kavitäten der Klassen I und II. - Provisorische Verschluss in der Endodontie. Gegenanzeigen Bei Allergien gegen Bestandteile von Cotosol® F. Langandauernde (mehr als 2 Wochen) provisorische Füllung von Kavitäten vitaler Zähne. Provisorische Füllung, bei welcher die Kavitätvorbereitung mehrfältig ist und bis an bzw. unter die Gingiva (subgingival) reicht. Nebenwirkungen Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden. Wechselwirkungen Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt. Vorbereitung Spitze montieren: Der Drehmechanismus (Schraubenspindel mit Schraubenmutter) liegt separat bei. Er ist mehrfach verwendbar, d.h. wenn ein Spitzenkörper gebraucht ist, wird er wieder herausgedreht und am nächsten Spitzenkörper befestigt. Applizieren von Cotosol® F Kavität mit Wasserspray anfeuchten. Vorbereitetes Cotosol® F mit einem Scalp oder Instrument von der Unterlage aufnehmen und in die Kavität applizieren. Cotosol® F mit einem Stopfer in die Kavität stopfen und durch leichtes Schütteln an die Kavitätswände adaptieren. Okklusale Kontaktpunkte mit einem Scaler abtragen. Es wird empfohlen, sehr tiefe Kavitäten nicht bis zum Kavitätenboden zu füllen, damit Cotosol® F leichter wieder aus der Kavität entfernt werden kann. Härtung Durch Wasseraufnahme (z.B. Speichelleinwirkung) härtet Cotosol® F innerhalb von 20 - 30 min oberflächlich. Nach 2 - 3 h kann die provisorische Füllung mit Kaudruck belastet werden. Die Aushärtung kann beschleunigt werden, indem Cotosol® F vor der Anwendung mit nassen Handschuhen angekeimt wird. Entfernen von Cotosol® F aus der Kavität Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen. Notfallmassnahmen, Symptome, Gegenmittel Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden. Toxikologische Eigenschaften Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen. Hinweise Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag. Für Kinder ungeeignet aufzubewahren! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen und Deckel wieder auf Spitze	

con una umidità relativa del 50%. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole o a fonti di calore. Cotosol® F può essere utilizzato fino alla data di scadenza indicata sui contenitori.

Scadenza	ES
La data di scadenza e il numero di lotto ☞ sono indicati sulle confezioni.	
Raccomandazioni per l'igiene Osservando le seguenti indicazioni, si assicurano condizioni igieniche ottimali per l'utilizzo di Cotosol® F: - Dosare le porzioni su di un blocco per miscelazione o sul vassoio individuale del paziente. - Il materiale in eccesso non va mai rimesso nel flacone di vetro.	
Data di pubblicazione delle istruzioni: 06-2018	
Información para el uso	ES
Definición Cotosol® F es un material de obturación de endurecimiento por humedad, radio-opaco, de color similar al diente, con el empaque provisional de cada cavidad. Cotosol® F se compone de cemento de óxido de cinc/ de sulfato de cinc y su sólo concebido para empastes provisionales de poca duración (máximo de una a dos semanas). Composición Oxido de cinc-1-hidrato Sulfato de calcio-hemihidrato Tierra de diatomas Resina EVA Fluoruro de Natrium Aroma de menta Endurecimiento Endurecimiento superficial en un e spazio de tiempo de: 20 - 30 min Se puede exponer a esfuerzo masticando despúes de: 2 - 3 h Camps de aplicacón - Empastes provisionales en cavidades de las clases I y II. - Cierre provisoria en la endodontia. Contraindicaciones En caso de alergia demostrada a los componentes del Cotosol® F. Empastes provisionales de larga duraci6n (de más de 2 semanas) en cavidades de dentales vitales. Empastes provisionales contra una preparaci6n de cavidad de varias capas que llega hasta la gingiva o debajo de ella (sub-gingival). Efectos secundarios Cotosol® F se endurece por absorci6n de agua. En cavidades de dientes vitales pueden llegar a producirse breves momentos de dolor por deshidrataci6n de la pieza. Por esta raz6n, antes de aplicar el Cotosol® F se tiene que humedecer la cavidad con un spray de agua. Cotosol® F se expande al endurecerse. Por un lado ello significa un alto grado de hermeticidad del empaste provisional, sin embargo, podria ocasionar la fractura de los bordes del esmalte si éstos quedaran excesivamente finos. Interacciones Se desconocen interacciones con otras sustancias. Preparaci6n Se prepara la jeringa. El mecanismo de giro (husillo de rosca y tuerca) se adjunta por separado. Es de aplicaci6n sencilla, es decir, cuando una jeringa se haya gastado, se puede desensocar el husillo de rosca y se vuelve a enrosar sobre la siguiente jeringa. Aplicaci6n de Cotosol® F A continuaci6n se deberá humedecer la cavidad con rociado de agua. Recoger el Cotosol® F preparando la superficie con una espátula u otro instrumento y aplicarlo a la cavidad. Rellenar la cavidad con Cotosol® F mediante un instrumento aserrigante y adaptar el producto a las paredes de la cavidad presionándolo ligeramente. Quitar puntos de contacto oclusivos con un escálapo. Se recomienda no rellenar cavidades profundas hasta el fondo, a fin de poder volver a extraer Cotosol® F fácilmente de la cavidad. Endurecimiento Cotosol® F se endurece superficialmente en un espacio de tiempo de 20 a 30 min si se entra en contacto con agua (p.ej. por efecto de la saliva). Después de 2 a 3 h, se puede masticar normalmente con el empaste provisional. Si se desea acelerar el endurecimiento del Cotosol® F, amasar con uñas sobre antes de su aplicaci6n. Extracci6n de Cotosol® F de la cavidad Con ayuda de un ultrasonido o de una fresa se puede extraer el empaste Cotosol® F sin dificultad alguna de la cavidad sacándolo por partes. A continuaci6n deberá enjuagarse la cavidad con rociado de agua para limpiarla de restos. Medidas a tomar en caso de emergencia, síntomas, contramedidas Se pueden evitar un peligro agudo al tragar por descuido Cotosol® F, ya que no es t6xico. En caso de contacto directo con la mucosa bucal bastará	

Hygiejne tips	
Følgende instruktør sikrer optimale hygiejniske betingelser når der bruges Cotosol® F: - Portionerne bør ikke afmåles tæt ved stolen, det bør gøres i instrumentområdet. - Overskyende materiale bør under ingen omstændigheder puttes tilbage i glasset.	
Brugsanvisning dateret	06-2018
Bruksanvisning	SV
Definition Cotosol® F är ett fukthärdande, röntgen-kontrasterande, vitt fyllningsmaterial för provisoriska fyllningar av tandkavitetar. Cotosol® F baserar på zinksulfat och zinksulfatfärg och är koncepterat för korttidsprovisioner (max. 1-2 veckor). Sammansättning zinkoxid zinkoxid-1-hydrat kalciumsulfat-hemihydrat diatomaciö jord EVA-harts natriumfluorid pepparmyntaroma Härdning Ytlig härdning inom: 20 - 30 min Genom tuggkraft belastbar efter: 2 - 3 h Användningsområde - Provisoriska fyllningar av kavitetar av klass I och II. - Provisorisk förslutning i endodonti. Kontraindikationer Vid allergier mot beståndsdelar av Cotosol® F. Långvariga (mer än 2 veckor) provisoriska fyllningar av kavitetar i vitala tänder. Provisoriska fyllningar till fylla preparatationen omfattar flera typer och går till, resp. under gingiva (subgingival). Biverkningar Cotosol® F härdas genom vattenupptagning. Genom att vatten unddras kan kortvarigt smärto i kavitetn på vitala tänder uppstå. Kavitetn bör därför fuktas med vattenspray innan Cotosol® F appliceras. Cotosol® F expanderar vid härdningen. Detta för å ena sidan till mycket tätta provisoriska fyllningar, å andra sidan kan mycket tunn emaljåder skadas. Växelverkningar Växelverkningar med andra medel är inte beaktat. Förberedning Montera sprutan: Skruvmejslens (skruvspindel med mutter) levereras separat. Den kan återanvändas, d.v.s. när innehållt i en spruta är förbrukat, skruvas den ur och sätts på nästa spruta. Applikation av Cotosol® F Fukta kavitetn med vattenspray. Fyll kavitetn förberett Cotosol® F med en spatel eller instrument i kavitetn. Fyllt applicera med Cotosol® F med hjälp av en stoppare och adaptera genom lätt stoppning mot kavitetväggarna. Okklusala kontaktpunkter avlägsnas med en scaler. Det är att rekommendera att inte fylla ändå till botten i mycket djupa hål. Så undvållas senare avlägsnandet av Cotosol® F ur kavitetn. Härdning Genom vattenupptagning (t.ex. salivnivån) kan härdning av Cotosol® F ylltig inom 20 - 30 min. Efter 2 - 3 timmar kan den provisoriska fyllningen belastas med tuggkraft. Härdningen kan påskyndas genom att Cotosol® F kändas med våta handskar före användning. Avlägsnande av Cotosol® F ur kavitetn Cotosol® F kan utan problem avlägsnas ur kavitetn i stora stycken, med hjälp av borr eller scaler. Sprut i eventuella restar med vattenspray. Skyddåtgärder, symptom, motmedel Akut fara vid ofrivilligt sväljande av Cotosol® F består ej, då mängderna är mycket små och oförljaga. Vid direkt kontakt med munslimhinnan rinner det i skåla med rikligt med vatten. Vid ögonkontakt skölj med rikligt med vatten (10 min) och uppsök ögonläkare. Toxikologiska egenskaper Cotosol® F är ej toxisk eller sensibiliserande. Kortvarigt uppträdande smärto beror på fuktighetsförlust vid härdningen. Upplysningar Information endast till tandläkare eller tandteknisk personal eller i dessas utvärdering. Förvaras ömtåmligt för barn! Får ej användas efter förfallodatum. Tillåtit glaskubben välj efter varje användning eller skruva tillbaka skruvspindeln en- till två gånger och sätt på locket på sprutan.	

Cotosol® F ist ein feuchtehärtendes, röntgenopakes, weisses Füllungsmaterial zur provisorischen Füllung von Zahnkavitäten. Cotosol® F basiert auf Zinkoxid- / Zinksulfaatfärbung und ist für Kurzzeitprovisionen (Einsatz von max. 1-2 Wochen) konzipiert.

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

Cotosol® F härtet durch Wasseraufnahme. In Kavitäten von vitalen Zähnen kann durch Wasserzug kurzzeitig Schmerz verursacht werden. Die Kavität soll daher vor dem Einbringen von Cotosol® F mit Wasserspray angefeuchtet werden. Cotosol® F expandiert beim Härten. Dies führt ei-nerseits zu sehr dichten provisorischen Füllungen, andererseits können sehr dünne Schmelzränder abgesprengt werden.

Cotosol® F lässt sich mit dem Bohrer oder Scaler mühelos in grossen Teilstücken wieder aus der Kavität entfernen. Alle flächigen Rückstände mit Wasserspray aus der Kavität spülen.

Eine akute Gefährdung durch versehentliches Verschlucken von Cotosol® F wegen der geringen angewendeten Menge und fehlender Toxizität auszuschliessen. Bei direktem Kontakt mit der Mundschleimhaut ist das Abspülen mit Wasser ausreichend. Bei Kontakt mit den Augen soll gründlich mit Wasser gespült (10 min) und dann ein Augenarzt konsultiert werden.

Cotosol® F ist nicht toxisch und nicht sensibilisierend. Kurzzeitig auftretende Schmerzen sind auf den Feuchtheitseinsatz bei der Härtung zurückzuführen.

Abgabe nur an Zahnärzte oder zahntechnisches Personal oder nur in deren Auftrag.
Für Kinder ungeeignet aufzubewahren!
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Nach jeder Anwendung Glasdose gut verschliessen oder **Schrauben-spindel ein- bis zweimal zurückdrehen** und Deckel wieder auf Spitze

