

## Használat:



A bőrnek tisztának, száraznak és zsírtól mentesnek kell lennie! A dobozt minden egyes használat előtt alaposan fel kell rázni. A lehető legkisebb mennyiségben alkalmazzuk az anyagot. A kézre elég a készítményből egy dió nagyságu mennyiség (szabványos használat).




A kéz belső és külső felületét alaposan dörzsöljük be a készítménnyel, ennek során ne felejtjük ki az ujjközöket és az ujjbegyeket sem.



2-3 percen keresztül hagyjuk beszívódni a készítményt a bőrbe. Ettől kezdve négy órán keresztül védelem alatt áll a bőr, még akkor is, ha ezen időtartam alatt többször is megmossák vagy fertőtlenítik a kézfelületet.


## Hatásmechanizmus:



Marly Skin védőreteget képez a stratum corneumban (bőrmetszet megfestett Marly Skin®-nel)  
Forrás: Prof. D.E. Schöpf, Prof. Dr. R. Niedner, Freiburgi Egyetemi Klinika



600-szoros nagyításban, közvetlenül a bőrre történő felvitel után



150-szeres nagyításban, 45 perc elteltével  
Forrás: Prof. Dr. C. Führer, Gyógyászati Technológiai Intézet, Braunschweigi Egyetem

**Ne feledje: Naponta 2x használjon Marly Skin®-t!**  
**...ne csak akármilyen krémet vagy védőhabot használjon, hanem**  
**Marly Skin®-t, - az igazi bőrvédelmet! Mert csak**  
**a Marly Skin® védőhatása nyert klinikai és bőrgyógyászati igazolást:**

**Marly Skin® nem toxikus, nincs allergizáló hatása, azaz nem irritálja a szemet, szájat, a nyálkahártyákat vagy a bőrt.**

Forrás: RCC, CH-Ittingen, 1988

**Megállapítható, hogy Marly Skin® a bemutatott tesztmodell szerint potenciális hatással van a 0,1 n NAOH által irritált bőrre.**

Marly Skin®-nel végzett alkálirezisztencia-teszt Burckhard szerint. A tesztet Prof. Dr. med. E. Schöpf és Prof. Dr. med. R. Niedner végezte el a Freiburgi Egyetemi Bőrklinikán.

**Egy akut irritatív reakció esetében elvégzett teszt során igazolható volt, hogy Marly Skin® meghatározott toxikus anyagok ellen kifejezett védelmet képes biztosítani a bőrnek.**

A tesztet Prof. Dr. med. Plewig végezte el a Düsseldorfi Egyetem Gyógyászati Intézetében (a vizsgálatot Marly Skin® dimethylszulfoxiddal és nátriumlaurilszulfáttal szembeni védőhatásával kapcsolatban végezték)

**Marly Skin® védelmet nyújt a fertőtlenítőszerrel szemben és nem csökkenti a higiéniai kézfertőtlenítés hatását. A kísérletben résztvevők kórokozók (escheria coli 3,7x10<sup>10</sup>) megfertőzött kezét vizsgálva megállapították, hogy a kórokozók száma mindkét kézen átlagosan kb. 24 %-kal csökkent.** Prof. Dr. K. Bößmann, Christian-Albrechts-Egyetemi Klinika, Kiel, Fog- , Száj- és Állkapocsgyógyászati Központ, Fogmegtartási Osztály (Marly Skin® vizsgálata higiéniai kézfertőtlenítés esetében).

**Marly Skin® védelmet nyújt az agresszív hatású fertőtlenítőszerrel szemben, és a gumikesztyű jobb elviselésére alkalmazható.** Prof. Dr. med. Wilhelm, Münchener Egyetem Sebészeti Poliklinikája, a Kézsebészeti Osztály vezetője.

**Az eredmény azt mutatja, hogy Marly Skin® kézfertőtlenítést megelőző alkalmazása során mind az azonnali, mind a hosszútávú hatás tekintetében előnyösebb eredményt lehetett elérni, mintha a fertőtlenítést Marly Skin® nélkül végezték volna.** Prof. Dr. med. B. Wille, Kórházhigiéniai és Infekcióellenőrzési Intézet, Gießen (Marly Skin®-t olyan személyeken tesztelték, akik rendszeresen érintkeznek vegyianyag- és alkoholtartalmú kézfertőtlenítő szerekkel)

**Marly Skin® különböző anyagok és mikroorganizmusok behatolása elleni védőhatását egy estradiol bőrön át történő felszívódásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzött kísérletben vizsgálták. Ennek során a hatóanyag behatolása a bőrbe kifejezetten gátolt volt, szemben azokkal a kísérletben részt vevő személyekkel, akiknél nem alkalmazták előzetes kezelésként a Marly Skin®-t.** Dr. med. K. Chlud, egyetemi docens, Kaiser-Franz-Josef-Spital, Wien, II. gyógyászati osztály, Reumatológia és Osteológia (ellenőrzött farmakokinetikai vizsgálatot végzett az Estradiol (transzdermális ösztrogéntapaszt) bőrön át történő felszívódásának Marly Skin® általi gátlásával kapcsolatban.